

Ce tableau résume les plus récentes mesures à mettre en place en lien avec les patients

Pour tous les cas d'isolement liés au COVID, utiliser l'affiche MRS-CV ([Cliquer ici](#))

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTES DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
PATIENTS			
<p>Patient symptomatique admis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arriver à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une chambre privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles). 	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arriver à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une chambre privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles). 	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arriver à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une chambre privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles).
<p>Patients asymptomatiques dans les catégories suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Admis et qui n'ont pas testées positives au cours des 90 derniers jours (PCR) Admis qui ne sont pas vaccinés ou pas pleinement vaccinés Qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions 	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arriver à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une 	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arriver à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une chambre 	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arriver à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une chambre

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
<p>de dépistages de la COVID-19 (par ex. : inconscient, démence, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soupçonnés sur le plan clinique d'être COVID+ et qui sont incapables de se conformer aux exigences d'isolement (par ex. : sans-abri) • Soupçonnés sur le plan clinique d'être COVID+ admis dans un centre de traitement des dépendances 	<p>chambre privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles).</p>	<p>privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles).</p>	<p>privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles).</p>
<p>Patient suspect ou confirmé COVID positif</p>	<p>Isolement gouttelettes/contact que le patient soit vacciné ou pas (utiliser affiche MRS-CV) et dépistage des patients symptomatiques. Si patient a eu un résultat positif à un POCT antérieur, confirmer par PCR et demander au microbiologiste la valeur CT afin de déterminer si vieux COVID et les mesures à prendre.</p>	<p>Isolement gouttelettes/contact que le patient soit vacciné ou pas (utiliser affiche MRS-CV) et dépistage des patients symptomatiques. Si patient a eu un résultat positif à un POCT antérieur, confirmer par PCR et demander au microbiologiste la valeur CT afin de déterminer si vieux COVID et les mesures à prendre.</p>	<p>Isolement gouttelettes/contact que le patient soit vacciné ou pas (utiliser affiche MRS-CV) et dépistage des patients symptomatiques. Si patient a eu un résultat positif à un POCT antérieur, confirmer par PCR et demander au microbiologiste la valeur CT afin de déterminer si vieux COVID et les mesures à prendre.</p>
<p>Patient avec PCR positif dans les derniers 90 jours</p>	<p>Aucune mesure à prendre si patient asymptomatique.</p>	<p>Aucune mesure à prendre si patient asymptomatique.</p>	<p>Aucune mesure à prendre si patient asymptomatique.</p>
<p>Transferts de patients suspects ou confirmés COVID positifs</p>	<p>Lors des transferts il n'est plus nécessaire d'avoir l'accompagnement d'un agent de sécurité et du service de l'environnement. Le transport peut se faire par une personne seulement (et autre personne au besoin - par ex. patient avec beaucoup de matériel à transporter, intraveineuse, patient instable, etc.).</p>	<p>Lors des transferts il n'est plus nécessaire d'avoir l'accompagnement d'un agent de sécurité et du service de l'environnement. Le transport peut se faire par une personne seulement (et autre personne au besoin - par ex. patient avec beaucoup de matériel à transporter, intraveineuse, patient instable, etc.).</p>	<p>Lors des transferts il n'est plus nécessaire d'avoir l'accompagnement d'un agent de sécurité et du service de l'environnement. Le transport peut se faire par une personne seulement (et autre personne au besoin - par ex. patient avec beaucoup de matériel à transporter, intraveineuse, patient instable, etc.).</p>

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
Patient contact Patient provenant des foyers de soins/résidences/en éclosion Patients admis provenant des centres correctionnels et les refuges pour sans-abri (en éclosion ou non)	Isolement gouttelettes/contact pour 10 jours du dernier contact que le patient soit vacciné ou pas (utiliser affiche MRS-CV). Dépistage aux jours 0, 5 et 10 et cesser isolement lorsque le résultat négatif du test au jour 10 est obtenu.	Isolement gouttelettes/contact pour 10 jours du dernier contact que le patient soit vacciné ou pas (utiliser affiche MRS-CV). Dépistage aux jours 0, 5 et 10 et cesser isolement lorsque le résultat négatif du test au jour 10 est obtenu.	Isolement gouttelettes/contact pour 10 jours du dernier contact que le patient soit vacciné ou pas (utiliser affiche MRS-CV). Dépistage aux jours 0, 5 et 10 et cesser isolement lorsque le résultat négatif du test au jour 10 est obtenu.
Patient provenant de ou ayant voyagé à l'extérieur du Canada dans les derniers 14 jours	Isolement gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche MRS-CV). Test COVID seulement si symptomatique.	Isolement gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche MRS-CV). Test COVID seulement si symptomatique	Isolement gouttelettes/contact préventif 14 jours (utiliser affiche MRS-CV). Test COVID seulement si symptomatique
Patient (interne ou externe) qui demeure sous le même toit qu'une personne COVID positif (dans les 10 jours précédant l'admission/ou rendez-vous)	Isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV). Test COVID seulement si symptomatique.	Isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV). Test COVID seulement si symptomatique.	Isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV). Test COVID seulement si symptomatique.
Cohorte des patients suspects COVID	En dernier recours, lorsqu'il ne reste plus de salle d'isolement, un plan de cohorte peut être établi sous les directives de l'infirmier(ière) de la PCI. Veuillez communiquer avec eux.	En dernier recours, lorsqu'il ne reste plus de salle d'isolement, un plan de cohorte peut être établi sous les directives de l'infirmier(ière) de la PCI. Veuillez communiquer avec eux.	En dernier recours, lorsqu'il ne reste plus de salle d'isolement, un plan de cohorte peut être établi sous les directives de l'infirmier(ière) de la PCI. Veuillez communiquer avec eux.
Cas chirurgicaux Test préop	Test COVID pour tous les cas pré-op au plus tard 72hr avant la chirurgie. Le patient doit s'isoler entre la date du test et la chirurgie. GeneXpert pour les chirurgies urgentes.	Le dépistage n'est pas recommandé pour les patients asymptomatiques <u>pleinement vaccinés*</u> sans facteurs de risque. Dépistage Pré-OP pour les patients qui répondent aux critères suivants : patients non vaccinés ou partiellement vaccinés, patients symptomatiques, ceux qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé, ceux provenant de ou ayant voyagé à l'international dans les 14 dernier jours ou provenant d'un milieu en éclosion. GeneXpert pour les chirurgies urgentes.	Dépistage Pré-OP pour les patients qui répondent aux critères suivants : patients symptomatiques, ceux qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé, ceux provenant de ou ayant voyagé à l'international dans les 14 dernier jours ou provenant d'un milieu en éclosion. GeneXpert pour les chirurgies urgentes.

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
Cas chirurgicaux isolement post-op patient hospitalisé	Isoler le patient qui provient/a voyagé à l'international, une fois arrivé sur l'unité pour 14 jours, même si test COVID préop négatif (utiliser affiche MRS-CV).	Isoler le patient qui provient/a voyagé à l'international, une fois arrivé sur l'unité pour 14 jours, même si test COVID préop négatif (utiliser affiche MRS-CV)	Isoler le patient qui provient/a voyagé à l'international, une fois arrivé sur l'unité pour 1 jours, même si test COVID préop négatif (utiliser affiche MRS-CV).
Traitement de sismothérapie (ECT) pour patient admis	<p><u>ECT urgent seulement</u></p> <p>Test COVID pour tous les cas cédulés au plus tard 72hr avant le traitement (même pour les cas qui ont plus de 1 traitement par semaine).</p>	<p>Le dépistage n'est pas nécessaire pour les patients asymptomatiques pleinement vaccinés* sans facteurs de risque. Faire un dépistage actif (poser les questions) chaque jour durant le séjour et test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques.</p> <p>Pour les patients non vaccinés ou partiellement vaccinés ou qui présentent un facteur de risque (par ex. : patients symptomatiques, ceux qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé, ceux provenant de ou ayant voyagé à l'international dans les derniers 14 jours ou provenant d'un milieu en éclosion), faire un test COVID deux (2) fois par semaine pendant les deux (2) premières semaines de traitement, pas besoin d'isoler le patient si asymptomatique.</p>	<p>Dépistage actif (poser les questions) chaque jour durant le séjour et test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques.</p>
Traitement de sismothérapie (ECT) pour patient en externe	<p><u>ECT urgent seulement</u></p> <p>Test COVID pour tous les cas cédulés au plus tard 72hr avant le traitement (même pour les cas qui ont plus de 1 traitement par semaine). Le patient doit s'isoler entre la date du test et le traitement ECT.</p>	<p>Le dépistage n'est pas nécessaire pour les patients asymptomatiques pleinement vaccinés* sans facteurs de risque. Faire un dépistage actif poser les questions avant chaque traitement et faire test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques.</p> <p>Pour les patients non vaccinés ou partiellement vaccinés ou qui présentent un facteur de risque (par ex. : patients symptomatiques, ceux qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé, ceux</p>	<p>Dépistage actif (poser les questions) avant chaque traitement et test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques.</p>

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
		provenant de ou ayant voyagé à l'international dans les derniers 14 jours ou provenant d'un milieu en éclosion), faire un test COVID deux (2) fois par semaine, au plus tard 72 hr avant chaque traitement d'ECT et patient doit s'isoler entre la date du test et la date du traitement d'ECT. Si patient a seulement un (1) traitement par semaine, test COVID une (1) fois par semaine au plus tard 72 hr avant chaque traitement et patient doit s'isoler entre la date du test et la date du traitement d'ECT.	
Test COVID pour patiente obstétrique en travail	<p>Effectuer un GeneXpert : sur toutes les patientes en travail.</p> <p>Dans la mesure du possible, placer un masque à la patiente en tout temps, lors du travail.</p> <p>Si la PSD d'une patiente en obstétrique provient/a voyagé à l'international dans les derniers 14 jours, il peut assister à l'accouchement s'il est asymptomatique et si selon l'évaluation du médecin traitant, les facteurs de risques sont faibles. La PSD doit faire l'hygiène des mains à l'entrée, porter un masque médical et se rendre directement à la salle d'accouchement avec une escorte. La patiente et la PSD doivent être placées en isolement (gouttelettes/contact) pour la durée du séjour (ou un maximum de 14 jours). La PSD doit porter un masque en continu et doit rester dans la chambre et ne pas se promener dans l'hôpital.</p>	<p>Effectuer un GeneXpert : sur toutes les patientes en travail soupçonnées sur le plan clinique d'être infectées par la COVID, ou qui ont été en contact étroit avec un cas connu, vivant dans un immeuble avec une grappe, au cours des 10 derniers jours.</p> <p>Dans la mesure du possible, placer un masque à la patiente en 2e stade du travail.</p> <p>Si la PSD provient/a voyagé à l'international dans les derniers 14 jours, il peut assister à l'accouchement s'il est asymptomatique et si selon l'évaluation du médecin traitant, les facteurs de risques sont faibles. La PSD doit faire l'hygiène des mains à l'entrée, porter un masque médical et se rendre directement à la salle d'accouchement avec une escorte. La patiente et la PSD doivent être placées en isolement (gouttelettes/contact) pour la durée du séjour (ou un maximum de 14 jours). La PSD doit porter un masque en continu et doit rester dans la chambre et ne pas se promener dans l'hôpital.</p>	<p>Effectuer un GeneXpert : sur toutes les patientes en travail soupçonnées sur le plan clinique d'être infectées par la COVID, ou qui ont été en contact étroit avec un cas connu, vivant dans un immeuble avec une grappe, au cours des 10 derniers jours.</p> <p>Si la PSD provient/a voyagé à l'international dans les derniers 14 jours, il peut assister à l'accouchement s'il est asymptomatique et si selon l'évaluation du médecin traitant, les facteurs de risques sont faibles. La PSD doit faire l'hygiène des mains à l'entrée, porter un masque médical et se rendre directement à la salle d'accouchement avec une escorte. La patiente et la PSD doivent être placées en isolement (gouttelettes/contact) pour la durée du séjour (ou un maximum de 14 jours). La PSD doit porter un masque en continu et doit rester dans la chambre et ne pas se promener dans l'hôpital.</p>

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
Patient qui subit un test COVID	Tout patient qui subit un test COVID doit être placé en isolement (utiliser affiche MRS-CV), sauf si le test COVID est effectué pour des raisons administratives (par ex. : dépistage sentinelle ou congé au foyer de soins). Au besoin, consulter l'inf. en PCI pour évaluer la nécessité de l'isolement.	Tout patient qui subit un test COVID doit être placé en isolement (utiliser affiche MRS-CV), sauf si le test COVID est effectué pour des raisons administratives (par ex. : dépistage sentinelle ou congé au foyer de soins). Au besoin, consulter l'inf. en PCI pour évaluer la nécessité de l'isolement.	Tout patient qui subit un test COVID doit être placé en isolement (utiliser affiche MRS-CV), sauf si le test COVID est effectué pour des raisons administratives (par ex. : dépistage sentinelle ou congé au foyer de soins). Au besoin, consulter l'inf. en PCI pour évaluer la nécessité de l'isolement.
Arrêt des précautions d'isolement pour cas positifs de COVID avec maladie légère à modérée Signes cliniques de pneumonie (fièvre, toux, dyspnée, tachypnée) peuvent être présents ou pas. Pas de signe de pneumonie sévère. Les patients n'ont pas besoin d'oxygène	<ul style="list-style-type: none"> • 10 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes OU la date du test de dépistage positif si le patient est asymptomatique ; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes OU la date du test de dépistage positif si le patient est asymptomatique ; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes OU la date du test de dépistage positif si le patient est asymptomatique ; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat).
Arrêt des précautions d'isolement pour cas positifs de COVID avec maladie sévère Patients ayant besoin d'oxygène. Fièvre ou suspect d'infection respiratoire en plus de 1 symptôme suivant : fréquence respiratoire > 30 resp/min, détresse respiratoire sévère ou SAO2 ≤92% air libre.	<ul style="list-style-type: none"> • 14 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat).
Arrêt des précautions d'isolement pour cas	• 20 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes; ET	• 20 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes; ET	• 20 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes; ET

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
<p>positifs de COVID qui sont immunosupprimés (ex. : ayant reçu une greffe d'organe solide) ou qui ont une maladie critique en raison de la COVID-19 (Admis aux Soins intensifs avec assistance respiratoire telle que: Airvo, Cpap, ventilateur. Peut être caractérisé par un SDRA, une septicémie ou un choc septique)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat).
<p>Patients avec thérapie respiratoire générant des aérosols par ex. CPAP, BiPAP, Airvo, Optiflo (incluant CPAP/BiPAP à domicile)</p> <p>Hyperlien Note</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avant d'initier la thérapie respiratoire générant des aérosols assurer qu'elle est absolument nécessaire. • Avant d'initier la thérapie un GeneXpert doit être fait (jour 0). En attente du résultat placer le patient dans une chambre a pression négative ou chambre privée avec porte fermer. • Si le test au jour 0 est négatif, l'isolement peut être cessé à moins qu'il y a suspicion clinique de COVID (pneumonie, lymphopénie, contact étroit ou autre). • Répète le test COVID au jour 2 • Si patient est COVID+ éviter la thérapie respiratoire générant des aérosols, si jugé cliniquement acceptable. Sinon le patient doit être dans une chambre à pression négative. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant d'initier la thérapie respiratoire générant des aérosols assurer qu'elle est absolument nécessaire. • Avant d'initier la thérapie un GeneXpert doit être fait (jour 0). En attente du résultat placer le patient dans une chambre a pression négative ou chambre privée avec porte fermer. • Si le test au jour 0 est négatif, l'isolement peut être cessé à moins qu'il y a suspicion clinique de COVID (pneumonie, lymphopénie, contact étroit ou autre). • Répète le test COVID au jour 2 • Si patient est COVID+ éviter la thérapie respiratoire générant des aérosols, si jugé cliniquement acceptable. Sinon le patient doit être dans une chambre à pression négative. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant d'initier la thérapie respiratoire générant des aérosols assurer qu'elle est absolument nécessaire. • Avant d'initier la thérapie un GeneXpert doit être fait (jour 0). En attente du résultat placer le patient dans une chambre a pression négative ou chambre privée avec porte fermer. • Si le test au jour 0 est négatif, l'isolement peut être cessé à moins qu'il y a suspicion clinique de COVID (pneumonie, lymphopénie, contact étroit ou autre). • Répète le test COVID au jour 2 • Si patient est COVID+ éviter la thérapie respiratoire générant des aérosols, si jugé cliniquement acceptable. Sinon le patient doit être dans une chambre à pression négative.
<p>Sorties temporaires des patients</p>	<p><u>Aucune sortie permise</u></p>	<p>Hyperlien : Note - Sorties temporaires</p>	<p>Hyperlien : Note - Sorties temporaires</p>

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
et sorties à l'extérieur sur le terrain de l'établissement	Les demandes, pour des fins thérapeutique seulement, sont gérées cas par cas.	<p>Sorties temporaires : permises seulement à des fins thérapeutiques et si elles s'inscrivent dans le plan de soins du patient. Permises si aucun occupant de la résidence du patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> -n'est en auto-isolement; -n'a des symptômes compatibles avec la COVID-19; -n'a été en contact avec un cas suspect ou confirmé de la COVID-19. -n'a voyagé à l'international dans les 14 jours précédents la sortie; <p>Sorties à l'extérieur : limiter les sorties à l'extérieur de l'unité ou de l'établissement à celles permises à des fins thérapeutiques et à celles qui s'inscrivent dans le plan de soins du patient.</p>	<p>Sorties temporaires et sorties à l'extérieur permises si la condition du patient le permet.</p> <p>Sorties temporaires : permis si aucun occupant de la résidence du patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> -n'est en auto-isolement; -n'a des symptômes compatibles avec la COVID-19; -n'a été en contact avec un cas suspect ou confirmé de la COVID-19. -n'a voyagé à l'international dans les 14 jours précédents la sortie; <p>Sorties à l'extérieur : le patient et l'accompagnateur doivent porter un masque en tout temps et la distanciation physique des autres personnes doit être respectée. L'hygiène des mains doit être effectuée à la sortie de l'unité et à l'entrée dans l'établissement par le patient et l'accompagnateur.</p>
Patient externe	Provenant de / ou ayant voyagé à l'international dans les 14 derniers jours – placer en isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV).	Provenant de / ou ayant voyagé à l'international dans les 14 derniers jours – placer en isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV).	Provenant de / ou ayant voyagé à l'international dans les 14 derniers jours – placer en isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV).
Masques	<p>Patient admis qui peut tolérer le masque, doit être demandé de porter un masque lorsque le travailleur de la santé est à l'intérieur du 2 mètres.</p> <p>Les patients hospitalisés devront porter un masque médical lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de leur chambre.</p> <p>Les patients ambulatoires devront mettre un masque fourni par le personnel aux entrées des établissements.</p>	<p>Patient admis peut être demandé de porter un masque selon l'évaluation du risque.</p> <p>Les patients hospitalisés devront porter un masque médical lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de leur chambre.</p> <p>Les patients ambulatoires devront mettre un masque fourni par le personnel aux entrées des établissements.</p>	<p>Patient admis peut être demandé de porter un masque selon l'évaluation du risque. Les patients hospitalisés devront porter un masque médical lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de leur chambre, sauf pour les patients des soins de longue durée/anciens combattants qui sont sur des unités fermées (c.-à.-d. pas de patients mixtes / médicaux sur l'unité).</p> <p>Les patients ambulatoires devront mettre un masque fourni par le personnel aux entrées des établissements.</p>

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
Distanciation physique	<p>L'exigence de distanciation physique dans les salles d'attente est 1 mètre.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les cafétérias et les salles de pause est de 2 mètres, sauf si une barrière physique est en place, 1 mètre est acceptable.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les aires de soins / salles de réveil est maintenue à 2 mètres.</p> <p>Les patients symptomatiques ou nécessitant un isolement seront dirigés directement vers une salle de procédure.</p> <p>Les mesures mises en place (ex. plexiglas ou séparateur) pour la séparation des patients dans les salles d'attente seront maintenues.</p>	<p>L'exigence de distanciation physique dans les salles d'attente est 1 mètre.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les cafétérias et les salles de pause est de 2 mètres, sauf si une barrière physique est en place, 1 mètre est acceptable.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les aires de soins / salles de réveil est maintenue à 2 mètres.</p> <p>Les patients symptomatiques ou nécessitant un isolement seront dirigés directement vers une salle de procédure.</p> <p>Les mesures mises en place (ex. plexiglas ou séparateur) pour la séparation des patients dans les salles d'attente seront maintenues.</p>	<p>L'exigence de distanciation physique dans les salles d'attente est 1 mètre.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les cafétérias et les salles de pause est de 2 mètres, sauf si une barrière physique est en place, 1 mètre est acceptable.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les aires de soins / salles de réveil est maintenue à 2 mètres.</p> <p>Les patients symptomatiques ou nécessitant un isolement seront dirigés directement vers une salle de procédure.</p> <p>Les mesures mises en place (ex. plexiglas ou séparateur) pour la séparation des patients dans les salles d'attente seront maintenues.</p>

***Pleinement vacciné :** 2e dose datant de plus 14 jours. Le Nouveau-Brunswick accepte tout vaccin contre la COVID-19 accepté par le gouvernement du Canada. Cela comprend 2 doses des vaccins fabriqués par Pfizer, Moderna, Astra Zeneca/COVISHIELD (peut être n'importe quelle combinaison de vaccins approuvés par le gouvernement du Canada) ou 1 dose du vaccin Janssen (Johnson & Johnson).