

Ce tableau résume les plus récentes mesures à mettre en place en lien avec les patients

Pour tous les cas d'isolement liés au COVID, utiliser l'affiche MRS-CV ([Cliquer ici](#))

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
PATIENTS			
<p>Patient symptomatique admis <i>(Ne pas oublier les autres virus respiratoires tel que l'influenza)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arrivée à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une chambre privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles). 	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arrivée à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une chambre privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles). 	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arrivée à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une chambre privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles).
<p>Patients asymptomatiques dans les catégories suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Admis et qui n'ont pas testées positives au cours des 90 derniers jours (PCR ou POCT) Qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions de dépistages de la COVID- 	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arrivée à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas nécessaire de l'isoler dans une 	<ul style="list-style-type: none"> Ces patients doivent subir un test rapide de la COVID-19 (GeneXpert). Tous les patients dépistés à l'urgence pour la COVID devraient attendre leur résultat avant de monter à l'unité. Si le patient doit monter à l'unité avant que le résultat soit sorti, <u>il doit être isolé MRS-CV à son arrivée à l'unité jusqu'à l'obtention du résultat.</u> Il n'est pas 	<ul style="list-style-type: none"> Les tests GeneXpert seront ajustés aux besoins basés sur les directives du groupe de travail de laboratoire COVID-19 provincial. Lorsqu'il y aura des changements, les critères seront diffusés aux prestataires concernés.

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
<p>19 (par ex. : inconscient, démence, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soupçonnés sur le plan clinique d'être COVID+ et qui sont incapables de se conformer aux exigences d'isolement (par ex. : sans-abri) • Soupçonnés sur le plan clinique d'être COVID+ admis dans un centre de traitement des dépendances 	<p>chambre privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles).</p>	<p>privée, isoler le patient dans son environnement (ex. patient isolé dans une chambre à deux : tirer le rideau, placer la pancarte d'isolement, placer une commode pour le patient, suivre les bonnes pratiques de base et de précautions additionnelles).</p>	
<p>Patient suspect ou confirmé COVID positif</p>	<p>Isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV) et dépistage des patients symptomatiques. Si patient a eu un résultat positif à un POCT antérieur, confirmer par PCR et demander au microbiologiste la valeur CT afin de déterminer si vieux COVID et les mesures à prendre.</p>	<p>Isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV) et dépistage des patients symptomatiques. Si patient a eu un résultat positif à un POCT antérieur, confirmer par PCR et demander au microbiologiste la valeur CT afin de déterminer si vieux COVID et les mesures à prendre.</p>	<p>Isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV) et dépistage des patients symptomatiques. Si patient a eu un résultat positif à un POCT antérieur, confirmer par PCR et demander au microbiologiste la valeur CT afin de déterminer si vieux COVID et les mesures à prendre.</p>
<p>Patient contact</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patient provenant des foyers de soins/résidences/ en éclosion • Patients admis provenant des centres correctionnels et les refuges pour sans-abri (en éclosion) • Contact étroit avec un cas COVID+ 	<p>Isolement gouttelettes/contact pour 7 jours du dernier contact (utiliser affiche MRS-CV). Dépistage aux jours 0, 5 et 7 et cesser isolement lorsque le résultat négatif du test au jour 7 est obtenu.</p>	<p>Isolement gouttelettes/contact pour 7 jours du dernier contact (utiliser affiche MRS-CV). Dépistage aux jours 0, 5 et 7 et cesser isolement lorsque le résultat négatif du test au jour 7 est obtenu.</p>	<p>Isolement gouttelettes/contact pour 7 jours du dernier contact (utiliser affiche MRS-CV). Dépistage aux jours 0, 5 et 7 et cesser isolement lorsque le résultat négatif du test au jour 7 est obtenu.</p>

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
Patient (interne ou externe) qui demeure sous le même toit qu'une personne COVID positif (dans les 7 jours précédant l'admission/ou rendez-vous)	Isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV). Test COVID seulement si symptomatique.	Isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV). Test COVID seulement si symptomatique.	Isolement gouttelettes/contact (utiliser affiche MRS-CV). Test COVID seulement si symptomatique.
Cohorte des patients suspects COVID	En dernier recours, lorsqu'il ne reste plus de salle d'isolement, un plan de cohorte peut être établi sous les directives de l'infirmier(ière) de la PCI . Veuillez communiquer avec eux.	En dernier recours, lorsqu'il ne reste plus de salle d'isolement, un plan de cohorte peut être établi sous les directives de l'infirmier(ière) de la PCI . Veuillez communiquer avec eux.	En dernier recours, lorsqu'il ne reste plus de salle d'isolement, un plan de cohorte peut être établi sous les directives de l'infirmier(ière) de la PCI . Veuillez communiquer avec eux.
Cas chirurgicaux Test préop	Test COVID pour tous les cas pré-op au plus tard 72hr avant la chirurgie. Le patient doit limiter ses contacts sociaux entre la date du test et la chirurgie. Si ce n'est pas possible, il devrait porter un masque. GeneXpert pour les chirurgies urgentes.	Test COVID pour tous les cas pré-op au plus tard 72hr avant la chirurgie. Le patient doit limiter ses contacts sociaux entre la date du test et la chirurgie. Si ce n'est pas possible, il devrait porter un masque. GeneXpert pour les chirurgies urgentes.	Dépistage Pré-OP pour les patients qui répondent aux critères suivants : patients symptomatiques, ceux qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé dans les 7 dernier jours ou provenant d'un milieu en éclosion. GeneXpert pour les chirurgies urgentes.
Traitement de sismothérapie (ECT) pour patient admis	<u>ECT urgent seulement</u> Test COVID pour tous les cas cédulés au plus tard 72hr avant le traitement (même pour les cas qui ont plus de 1 traitement par semaine).	Le dépistage n'est pas nécessaire pour les patients asymptomatiques sans facteurs de risque. Faire un dépistage actif (poser les questions) chaque jour durant le séjour et test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques. Pour les patients qui présentent un facteur de risque (par ex. : patients symptomatiques, ceux qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé dans les derniers 7 jours ou provenant d'un milieu en éclosion), faire un test COVID deux (2) fois par semaine pendant les deux (2) premières semaines de traitement, pas besoin d'isoler le patient si asymptomatique.	Dépistage actif (poser les questions) chaque jour durant le séjour et test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques.

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
Traitement de sismothérapie (ECT) pour patient en externe	<p><u>ECT urgent seulement</u></p> <p>Test COVID pour tous les cas cédulés au plus tard 72hr avant le traitement (même pour les cas qui ont plus de 1 traitement par semaine). Le patient doit limiter ses contacts sociaux entre la date du test et le traitement ECT.</p>	<p>Le dépistage n'est pas nécessaire pour les patients asymptomatiques sans facteurs de risque. Faire un dépistage actif poser les questions avant chaque traitement et faire test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques.</p> <p>Pour les patients ou qui présentent un facteur de risque (par ex. : patients symptomatiques, ceux qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé dans les derniers 7 jours ou provenant d'un milieu en éclosion), faire un test COVID deux (2) fois par semaine, au plus tard 72 hr avant chaque traitement d'ECT et patient doit s'isoler entre la date du test et la date du traitement d'ECT. Si patient a seulement un (1) traitement par semaine, test COVID une (1) fois par semaine au plus tard 72 hr avant chaque traitement et patient doit s'isoler entre la date du test et la date du traitement d'ECT.</p>	<p>Dépistage actif (poser les questions) avant chaque traitement et test COVID-19 seulement pour les patients symptomatiques.</p>
Test COVID pour patiente obstétrique en travail	<p>Effectuer un GeneXpert : sur toutes les patientes en travail.</p> <p>Dans la mesure du possible, placer un masque à la patiente en tout temps, lors du travail.</p>	<p>Effectuer un GeneXpert : sur toutes les patientes en travail soupçonnées sur le plan clinique d'être infectées par la COVID, ou qui ont été en contact étroit avec un cas connu, vivant dans un immeuble avec une grappe, au cours des 7 derniers jours.</p> <p>Dans la mesure du possible, placer un masque à la patiente en 2e stade du travail.</p>	<p>Effectuer un GeneXpert : sur toutes les patientes en travail soupçonnées sur le plan clinique d'être infectées par la COVID, ou qui ont été en contact étroit avec un cas connu, vivant dans un immeuble avec une grappe, au cours des 7 derniers jours.</p>
Patient qui subit un test COVID	<p>Tout patient qui subit un test COVID doit être placé en isolement (utiliser affiche MRS-CV), sauf si le test COVID est effectué pour des raisons administratives (par ex. : dépistage sentinelle ou congé au foyer de</p>	<p>Tout patient qui subit un test COVID doit être placé en isolement (utiliser affiche MRS-CV), sauf si le test COVID est effectué pour des raisons administratives (par ex. : dépistage sentinelle ou congé au foyer de</p>	<p>Tout patient qui subit un test COVID doit être placé en isolement (utiliser affiche MRS-CV), sauf si le test COVID est effectué pour des raisons administratives (par ex. : dépistage sentinelle ou congé au foyer de</p>

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
	soins). Au besoin, consulter l'inf. en PCI pour évaluer la nécessité de l'isolement.	soins). Au besoin, consulter l'inf. en PCI pour évaluer la nécessité de l'isolement.	soins). Au besoin, consulter l'inf. en PCI pour évaluer la nécessité de l'isolement.
<p>Arrêt des précautions d'isolement pour cas positifs de COVID avec maladie légère à modérée Signes cliniques de pneumonie (fièvre, toux, dyspnée, tachypnée) peuvent être présents ou pas. Pas de signe de pneumonie sévère. Les patients n'ont pas besoin d'oxygène</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes OU la date du test de dépistage positif si le patient est asymptomatique ; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes OU la date du test de dépistage positif si le patient est asymptomatique ; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes OU la date du test de dépistage positif si le patient est asymptomatique ; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat).
<p>Arrêt des précautions d'isolement pour cas positifs de COVID avec maladie sévère Patients ayant besoin d'oxygène. Fièvre ou suspect d'infection respiratoire en plus de 1 symptôme suivant : fréquence respiratoire > 30 resp/min, détresse respiratoire sévère ou SAO2 ≤92% air libre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 14 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes ; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes ; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes ; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat).
<p>Arrêt des précautions d'isolement pour cas positifs de COVID qui sont immunosupprimés (ex. : ayant reçu une greffe d'organe solide) ou qui ont</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat). 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 jours qui se sont écoulés depuis l'apparition des symptômes; ET • Absence de fièvre depuis 24 heures sans médicament antipyrétique ; ET • Amélioration de l'état clinique (excluant la perte du goût ou de l'odorat).

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
<p>une maladie critique en raison de la COVID-19 (Admis aux Soins intensifs avec assistance respiratoire telle que: Airvo, Cpap, ventilateur. Peut être caractérisé par un SDRA, une septicémie ou un choc septique)</p>			
<p>Patients avec thérapie respiratoire générant des aérosols par ex. CPAP, BiPAP, Airvo, Optiflo (incluant CPAP/BiPAP à domicile)</p> <p>Hyperlien Note</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avant d'initier la thérapie respiratoire générant des aérosols assurer qu'elle est absolument nécessaire. • Avant d'initier la thérapie un GeneXpert doit être fait (jour 0). En attente du résultat placer le patient dans une chambre a pression négative ou chambre privée avec porte fermer. • Si le test au jour 0 est négatif, l'isolement peut être cessé à moins qu'il y a suspicion clinique de COVID (pneumonie, lymphopénie, contact étroit ou autre). • Répète le test COVID au jour 2 • Si patient est COVID+ éviter la thérapie respiratoire générant des aérosols, si jugé cliniquement acceptable. Sinon le patient doit être dans une chambre à pression négative. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant d'initier la thérapie respiratoire générant des aérosols assurer qu'elle est absolument nécessaire. • Avant d'initier la thérapie un GeneXpert doit être fait (jour 0). En attente du résultat placer le patient dans une chambre a pression négative ou chambre privée avec porte fermer. • Si le test au jour 0 est négatif, l'isolement peut être cessé à moins qu'il y a suspicion clinique de COVID (pneumonie, lymphopénie, contact étroit ou autre). • Répète le test COVID au jour 2 • Si patient est COVID+ éviter la thérapie respiratoire générant des aérosols, si jugé cliniquement acceptable. Sinon le patient doit être dans une chambre à pression négative. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant d'initier la thérapie respiratoire générant des aérosols assurer qu'elle est absolument nécessaire. • Avant d'initier la thérapie un GeneXpert doit être fait (jour 0). En attente du résultat placer le patient dans une chambre a pression négative ou chambre privée avec porte fermer. • Si le test au jour 0 est négatif, l'isolement peut être cessé à moins qu'il y a suspicion clinique de COVID (pneumonie, lymphopénie, contact étroit ou autre). • Répète le test COVID au jour 2 • Si patient est COVID+ éviter la thérapie respiratoire générant des aérosols, si jugé cliniquement acceptable. Sinon le patient doit être dans une chambre à pression négative.
<p>Sorties temporaires des patients et sorties à l'extérieur sur le terrain de l'établissement</p>	<p>Sorties temporaires et sorties à l'extérieur permises si la condition du patient le permet.</p> <p>Pour les Sorties temporaires assurez qu'aucun occupant de la résidence du patient :</p>	<p>Sorties temporaires et sorties à l'extérieur permises si la condition du patient le permet.</p> <p>Pour les Sorties temporaires assurez qu'aucun occupant de la résidence du patient :</p>	<p>Sorties temporaires et sorties à l'extérieur permises si la condition du patient le permet.</p>

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
	<p>-n'est en auto-isolement; -n'a des symptômes compatibles avec la COVID-19; -n'a été en contact avec un cas suspect ou confirmé de la COVID-19.</p> <p>Sorties à l'extérieur : le patient et l'accompagnateur sont encouragés de respecter la distanciation physique des autres personnes. L'hygiène des mains doit être effectuée à la sortie de l'unité et à l'entrée dans l'établissement par le patient et l'accompagnateur</p>	<p>-n'est en auto-isolement; -n'a des symptômes compatibles avec la COVID-19; -n'a été en contact avec un cas suspect ou confirmé de la COVID-19.</p> <p>Sorties à l'extérieur : le patient et l'accompagnateur sont encouragés de respecter la distanciation physique des autres personnes. L'hygiène des mains doit être effectuée à la sortie de l'unité et à l'entrée dans l'établissement par le patient et l'accompagnateur.</p>	<p>Pour les Sorties temporaires assurez qu'aucun occupant de la résidence du patient :</p> <p>-n'est en auto-isolement; -n'a des symptômes compatibles avec la COVID-19; -n'a été en contact avec un cas suspect ou confirmé de la COVID-19.</p> <p>Sorties à l'extérieur : le patient et l'accompagnateur sont encouragés de respecter la distanciation physique des autres personnes. L'hygiène des mains doit être effectuée à la sortie de l'unité et à l'entrée dans l'établissement par le patient et l'accompagnateur.</p>
Test sentinelle	<ul style="list-style-type: none"> • 5 patients asymptomatiques deux fois semaine sur les unités qui ne sont pas en éclosion ou en exposition ceci inclut le CHR sauf la F1. • Pour les unités de moins de 10 patients, 2-3 tests sentinelles sur des patients asymptomatique 2 fois par semaine. • On exclut les patients palliatifs et les patients qui ont eu un test positif (PCR) à la COVID dans les derniers 90 jours. 	<p>Faire 5 tests sentinelles sur des patients asymptomatiques deux fois par semaine si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'établissement est en éclosion. • Si l'unité est en exposition. • Si des patients COVID+ sont admis sur l'unité. 	<p>Faire 5 tests sentinelles sur des patients asymptomatiques deux fois par semaine si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'établissement est en éclosion. • Si l'unité est en exposition. • Si des patients COVID+ sont admis sur l'unité.
Masques	Patient admis qui peut tolérer le masque, doit être demandé de porter un masque lorsque le travailleur de la santé est à	Patient admis peut être demandé de porter un masque selon l'évaluation du risque et sur les unités en expositions ou éclosions.	Patient admis peut être demandé de porter un masque selon l'évaluation du risque et sur les unités en expositions ou

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
	<p>l'intérieur du 2 mètres et sur les unités en expositions ou éclosions.</p> <p>Les patients hospitalisés devront porter un masque médical lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de leur chambre.</p> <p>Les patients ambulatoires devront mettre un masque fourni par le personnel aux entrées des établissements.</p>	<p>Les patients hospitalisés devront porter un masque médical lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de leur chambre.</p> <p>Les patients ambulatoires devront mettre un masque fourni par le personnel aux entrées des établissements.</p>	<p>éclosions. Les patients hospitalisés devront porter un masque médical lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de leur chambre, sauf pour les patients des soins de longue durée/anciens combattants qui sont sur des unités fermées (c.-à.-d. pas de patients mixtes / médicaux sur l'unité).</p> <p>Les patients ambulatoires devront mettre un masque fourni par le personnel aux entrées des établissements.</p>
Distanciation physique	<p>L'exigence de distanciation physique dans les salles d'attente est 1 mètre.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les salles de classe/conférence est 1 mètre avec port de masque en tout temps.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les cafétérias et les salles de pause est de 2 mètres, sauf si une barrière physique est en place, 1 mètre est acceptable.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les aires de soins / salles de réveil est maintenue à 2 mètres. 1 mètre acceptable si port du masque.</p> <p>Les patients symptomatiques ou nécessitant un isolement seront dirigés directement vers une salle de procédure.</p> <p>Les mesures mises en place (ex. plexiglas ou séparateur) pour la séparation des</p>	<p>L'exigence de distanciation physique dans les salles d'attente est 1 mètre.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les salles de classe/conférence est 1 mètre avec port de masque en tout temps.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les cafétérias et les salles de pause est de 2 mètres, sauf si une barrière physique est en place, 1 mètre est acceptable.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les aires de soins / salles de réveil est maintenue à 2 mètres. 1 mètre acceptable si port du masque.</p> <p>Les patients symptomatiques ou nécessitant un isolement seront dirigés directement vers une salle de procédure.</p> <p>Les mesures mises en place (ex. plexiglas ou séparateur) pour la séparation des patients dans les salles d'attente seront maintenues.</p>	<p>L'exigence de distanciation physique dans les salles d'attente est 1 mètre.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les salles de classe/conférence est 1 mètre avec port de masque en tout temps.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les cafétérias et les salles de pause est de 2 mètres, sauf si une barrière physique est en place, 1 mètre est acceptable.</p> <p>L'exigence de distanciation physique dans les aires de soins / salles de réveil est maintenue à 2 mètres. 1 mètre acceptable si port du masque.</p> <p>Les patients symptomatiques ou nécessitant un isolement seront dirigés directement vers une salle de procédure.</p> <p>Les mesures mises en place (ex. plexiglas ou séparateur) pour la séparation des patients dans les salles d'attente seront maintenues</p>

SECTIONS	NIVEAUX D'ALERTE DANS LA ZONE OU L'ÉTABLISSEMENT		
	PHASE ROUGE INTERNE	PHASE ORANGE INTERNE	PHASE JAUNE INTERNE
	patients dans les salles d'attente seront maintenues.		
Visites des animaux	<p>Les chiens de service sont toujours permis.</p> <p>Les visites d'animaux de compagnie sont permises dans toutes les phases de la pandémie sauf en confinement, mais ne doivent pas causer un risque pour le patient ou le travailleur de la santé dans le contexte de la pandémie. Toujours suivre les directives de la politique GEN.3.80.80 lors des visites d'animaux.</p> <p>La zoothérapie est débutée sur certaines unités mais ceci exclut les unités en éclosions. Toutes les règles de PCI doivent être suivies en tout temps.</p>		

***Pleinement vacciné :** 2e dose datant de plus 14 jours. Le Nouveau-Brunswick accepte tout vaccin contre la COVID-19 accepté par le gouvernement du Canada. Cela comprend 2 doses des vaccins fabriqués par Pfizer, Moderna, Astra Zeneca/COVISHIELD (peut être n'importe quelle combinaison de vaccins approuvés par le gouvernement du Canada) ou 1 dose du vaccin Janssen (Johnson & Johnson).