

# Algorithme C CHUGLD:

Patient arrivant par Ambulance, histoire clinique de COVID-19 inconnue et incapable d'être déterminée au triage

## Critère COVID-19

Est-ce que le patient a voyagé dans les derniers 14 jours? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Si oui, pays ou province voyagé : _____ Date du retour : _____ <small>(aaaa-mm-jj)</small>	
Est-ce que le patient a été en contact avec une personne avec maladie respiratoire aiguë qui a voyagé dans les derniers 14 jours? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Est-ce que le patient a été en contact avec un cas confirmé ou probable de COVID-19? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Critères de dépistage COVID-19	
Doit présenter avec l'un des éléments suivants:	Doit répondre à l'un des critères suivants :
<input type="checkbox"/> Température > 38,0	<input type="checkbox"/> Voyage à l'extérieur du Nouveau-Brunswick au cours des 14 derniers jours
<input type="checkbox"/> Antécédents récents de fièvre / frissons	<input type="checkbox"/> Contact avec un cas confirmé ou probable au cours des 14 derniers jours
<input type="checkbox"/> Apparition d'une toux (ou exacerbation de la toux chronique)	<input type="checkbox"/> Contact étroit avec une personne atteinte d'une maladie respiratoire aiguë qui a voyagé à l'extérieur du Nouveau-Brunswick au cours des 14 derniers jours
	<input type="checkbox"/> A été exposé en laboratoire à du matériel biologique (p. ex. Échantillons cliniques primaires, virus isolats de cultures) connus pour contenir COVID-19.

Préavis de ANB avec rapport détaillé

Habillé personnel non-intubé et ISO MRS  
ou I-CEL ISO MRS

Aviser l'intensiviste si intubé ou arrêt cardio resp. et Inhalo

**Arrêter à l'intérieur de la tente**

Transfert le pt sur une civière d'urgenc ou chaise roulante

Évaluation par l'infirmière de triage selon CTAS et critères dépistage COVID-19

Non intubé

Intubé

Arrêt cardio resp.

Clinique de dépistage

Besoin d'un médecin?

Traité comme patient avec suspicion COVID-19

Installé dans la salle dédiée de réanimation avec porte fermé sous isolation MRS (Trauma 1)

Suspicion COVID-19

Voir algorithme A

Procédure régulière

Utiliser précaution pour pt avec symptômes infectieux et/ou dyspnée et sans critère de dépistage du COVID-19

Défibrillation si approprié

Intubation

Massage

ACLS

Isolation gouttelette: Masque chirurgical, jaquette, visière et gants

Isolation MRS (maladie respiratoire sévère): Masque N95, jaquette, visière et gants

Note: cette algorithme est dynamique

Mise à jour: 2020-03-30 à 09:00