

## Foire aux questions : Quand faut-il se faire vacciner après une infection à la COVID-19 ?

Mis à jour le 12 juillet 2022

Les vaccins contre la COVID demeurent une première défense essentielle contre les maladies graves et les décès liés à la COVID-19, même pour ceux qui ont des historiques d'infections antérieures. Avec la présence d'Omicron et l'apparition probable de nouveaux variants à l'avenir, les vaccins primaires et les doses de rappel fourniront une protection optimale et à long terme contre la COVID-19. Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et le Nouveau-Brunswick recommandent aux personnes de **rester à jour** avec les vaccins contre la COVID recommandés.

### 1. Quel est le niveau de protection contre les infections ?

Selon les études des autres variants qui ont circulé avant Omicron, une infection antérieure offre une certaine protection contre une réinfection, mais cette protection diminue au fil du temps.

Le risque de réinfection au variant Omicron (parmi les personnes qui ont déjà eu la COVID-19) est plus élevé que le risque de réinfection aux variants précédents. La vaccination devrait renforcer la réponse immunitaire afin de fournir une protection plus durable contre les variants actuels et futurs. Voilà pourquoi une vaccination **complète et à jour** contre la COVID-19 est recommandée, afin d'avoir la meilleure protection possible à l'avenir contre les formes graves de la COVID-19.

### 2. Concernant les personnes de 5 ans et plus qui ne sont pas vaccinées, mais qui ont été infectées par la COVID-19 : quand devraient-elles obtenir une première dose de vaccin ?

Si vous ou votre enfant n'avez jamais été vaccinés contre la COVID-19, vous pouvez prendre rendez-vous pour obtenir une première dose (**âgé de 5 ans ou plus**) 8 semaines après l'apparition des symptômes ou un test positif (si asymptomatique).

### 3. Concernant les personnes de 5 ans et plus, non considérées comme modérément ou gravement immunodéprimées, qui n'ont pas d'antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (SIME) et qui ont reçu une dose de la série primaire de vaccins contre la COVID-19 (p. ex. qui n'ont pas encore reçu leur deuxième dose) : quand est-il possible de prendre rendez-vous pour obtenir la prochaine dose du vaccin ?

Il est recommandé que de prendre rendez-vous pour obtenir la deuxième dose **Huit** semaines après l'apparition des symptômes ou un résultat de test positif à la COVID-19.

- 4. Concernant les personnes de 5 ans et plus qui ont besoin d'une série de 3 doses, considérées comme modérément ou gravement immunodéprimées sans antécédents de SIME et qui ont déjà reçu au moins une dose d'une série primaire de vaccin contre la COVID-19 (p. ex. qui n'ont pas encore reçu la deuxième ou la troisième dose d'une série primaire) : quand faudrait-il prendre rendez-vous pour obtenir la prochaine dose de vaccin ?**

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour obtenir la prochaine dose de quatre à huit semaines après l'apparition des symptômes ou un résultat de test positif à la COVID-19. Cela s'applique à une deuxième ou à une troisième dose.

- 5. Concernant les personnes de 5 ans et plus avec antécédents de SIME (qu'elles soient en santé ou immunodéprimées) et qui ont reçu au moins une dose d'une série primaire de vaccin contre la COVID-19 (p. ex. qui n'ont pas encore reçu la deuxième ou la troisième dose d'une série primaire) : quand faudrait-il prendre rendez-vous pour obtenir la prochaine dose de vaccin ?**

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour obtenir la prochaine dose après que la personne soit rétablie ou que 90 jours se sont écoulés depuis le diagnostic du fournisseur de soins de santé (selon la période la plus longue).

- 6. Concernant les personnes de 12 ans et plus qui ont terminé leur série primaire de vaccins, mais qui ont été infectées avant de recevoir la dose de rappel (qu'elles soient en santé ou immunodéprimées) : quand faudrait-il prendre rendez-vous pour obtenir une dose de rappel ?**

**À compter du 12 juillet 2022**, il est recommandé de prendre rendez-vous pour obtenir votre dose de rappel **5 mois** après votre dernière dose de vaccin ou la date de l'infection à la COVID-19.

- 7. Concernant les personnes qui aimeraient recevoir leur prochaine dose de vaccin plus tôt que dans l'intervalle recommandé : est-il possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner plus tôt ?**

Ces intervalles servent de guide. Si vous ne savez pas comment les appliquer à votre situation, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé primaire. Il est important de respecter ces intervalles dans la mesure du possible, compte tenu des avantages d'une meilleure réponse immunitaire et d'une protection accrue contre la COVID-19.

Les symptômes d'une forme aiguë de la maladie devraient au moins avoir complètement disparu. Vous ne devriez pas être contagieux avant la vaccination (c.-à-d. que 10 jours se sont écoulés depuis le début de votre quarantaine) et que vous rencontrez les critères d'éligibilités pour obtenir votre prochaine dose.