

## Tableau clinique potentiel de la TITIV

- Un des éléments suivants :**
- mal de tête sévère qui persiste;
  - symptômes neurologiques focaux;
  - convulsions, vision trouble ou double (indiquant une TVC ou un AVC artériel);
  - essoufflement ou douleur thoracique (indiquant une embolie pulmonaire ou un syndrome coronarien aigu);
  - douleurs abdominales (indiquant une thrombose de la veine porte);
  - membre enflé, rouge, pâle ou froid (indiquant une thrombose veineuse profonde ou une ischémie aiguë des membres).

- Déterminez l'historique et la date de vaccination contre la COVID-19 du patient (de 4 à 28 jours post-vaccination)
- Éliminez l'infection à la COVID-19 si nécessaire

Administration du vaccin contre la COVID-19 de 4 à 28 jours avant

### Analyses sanguines

- Formule Sanguine
- D-dimères
- Fibrinogène
- Frottis de sang périphérique

Nombre de plaquettes égal ou inférieur à  $150 \times 10^9 /L$ .

Examinez les autres analyses sanguines

- Taux de d-dimères (élevé)
- Fibrinogène (bas)
- Frottis de sang périphérique (normal)

Imagerie diagnostique ou intervention chirurgicale pour thrombose

**Présence de thrombose**

**TITIV PRÉSUMÉE**

Consultation hématologique  
Test pour la TIH  
(immunoenzymatique)

Absence de thrombose

**THROMBOCYTOPÉNIE  
IMMUNITAIRE PRÉSUMÉE**

Signaler en tant qu'incident indésirable suivant une vaccination

Nombre de plaquettes supérieur à  $150 \times 10^9 /L$

Imagerie diagnostique ou intervention chirurgicale pour thrombose

Absence de thrombose

Pas une TITIV

**Présence de thrombose**

**DÉBUT PRÉSUMÉ DE TITIV**

Continuez à évaluer la thrombocytopénie